



Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти



[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

» Меридиан легких (P) [11]

» Меридиан толстой кишки (GI) [20]

» Меридиан желудка (E) [45]

» Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]

» Меридиан сердца (C) [9]

» Меридиан тонкой кишки (IG) [19]

» Меридиан мочевого пузыря (V) [67]

» Меридиан почек (R) [27]

» Меридиан перикарда (MC) [9]

» Меридиан трех частей туловища (TR) [23]

» Меридиан желчного пузыря (VB) [44]

» Меридиан печени (F) [14]

» Задний срединный меридиан (VG) [28]

» Передний срединный меридиан (VC) [24]

» Внеканальные точки PC [175]

» Новые точки [110]

» Дополнительные материалы [18]

Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан толстой кишки \(GI\)](#)


GI6 Пянь-ли

Первое упоминание: канон «Лин шу».

Классификация: точка коллатерали ручного ян-мин канала толстого кишечника, соединяющейся с ручным тай-инь каналом легких.

Название: «пянь» - «наискось»; «ли» - «проходить, пересекать». В месте расположения этой точки ответвляется коллатераль ручного ян-мин канала толстого кишечника, которая соединяется с ручным тай-инь каналом легких, «проходя наискось» внутри руки.

Другие названия: —



Локализация: на линии, соединяющей точки Ян-си GI.5 и Цюй-чи GI.11, на 3 цуня выше точки Ян-си GI.5.

Для нахождения точки часто применяется следующий способ: пациент скрещивает руки через промежутки между большими и указательными пальцами. Точка Пянь-ли GI.6 находится в углублении на уровне кончика среднего пальца.

Функции:

1. Пянь-ли GI.6 — точка коллатерали ручного ян-мин канала толстого кишечника. В каноне «Лин шу» говорится:

«Ответвляющаяся [коллатераль] ручного ян-мин [канала толстого кишечника] называется Пянь-ли... При избытке — карие и глухота, при недостатке — холод в зубах, застой Ци в области диафрагмы. [При лечении этих болезней] используйте ее в месте ответвления [в точке Пянь-ли GI.6].»


2. Пянь-ли GI.6 — точка коллатерали ручного ян-мин канала толстого кишечника, через которую осуществляется наружно-внутренняя взаимосвязь каналов толстого кишечника и легких. Легкие регулируют движение в водных путях. При ослаблении этой функции легких, а также при нарушении опускающей способности Ци легких могут возникнуть различные нарушения водного обмена. Основной функцией Пянь-ли GI.6 является нормализация функций легких по регулировке циркуляции в водных путях. Использование точки способствует выведению мочи и эффективно при лечении затрудненного мочеиспускания, водянки, отеков.

3. Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяин-гость» при лечении болезней ручного тай-инь канала легких можно применять сочетание точек Тай-юань P.9 и Пянь-ли GI.6. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукальвания и прижигания, 1601 г.) говорится:

«В [ручном] тай-инь [канале легких] много Ци и мало крови. Чувство переполнения в грудной клетке и жар в ладонях, одышка, кашель, невыносимая боль в надключичной ямке, воспаление горла, сухость в горле, пот на теле, боль в передней части надплечья и в области сосков, в диафрагме скапливается мокрота и возникает нехватка воздуха. Какие же точки следует использовать при возникших болезнях? Все достойные мужи говорят: Тай-юань [P.9] и Пянь-ли [GI.6].»

4. Ручной ян-мин канал толстого кишечника проходит по шее. Кроме того, этот канал имеет наружно-внутреннюю взаимосвязь с ручным тай-инь каналом легких, а легкие тесно связаны с горлом. Именно поэтому точку Пянь-ли GI.6 можно использовать при лечении воспаления горла и сухости в горле.

5. В манускриптах из кургана Мавандуй ручной ян-мин канал толстого кишечника описывается под названием «зубной сосуд», так как входит в нижние зубы. Поэтому многие точки этого канала эффективны при лечении болезней зубов. В частности, точку Пянь-ли GI.6 можно использовать при кариесе, ощущении



Онлайн всего: **14**

 Гости: **11**

 Пользователей: **3**

[Roberttop](#),

[Wandagasia](#),

[EdwinRhype](#)

холода в зубах, зубной боли.

6. Коллатераль ручного ян-мин канала толстого кишечника входит в ухо, поэтому точку Пянь-ли GI.6 можно использовать при лечении понижения слуха, шума в ушах и глухоты.



Показано:

- Болезни коллатерали канала толстого кишечника: при избытке — кариес и глухота, при недостатке — ощущение холода в зубах, чувство сдавленности грудной клетки, вызванное застоем Ци.
- Болезни водного обмена: затрудненное мочеиспускание, водянка, отечность щек.
- Болезни ручного тай-инь канала легких: кашель, одышка, кровохарканье, боль в горле, чувство переполнения в грудной клетке, беспокойство, частое мочеиспускание, ощущение жара в ладонях, боль в надключичной ямке, похолодание, онемение и боль в верхних конечностях по ходу канала.
- Болезни ручного ян-мин канала толстого кишечника: зубная боль, воспаление горла, насморк, носовое кровотечение, сухость во рту, боль и нарушение двигательной функции верхних конечностей.
- Болезни горла: воспаление горла, сухость в горле.
- Болезни зубов: кариес, ощущение холода в зубах, зубная боль.
- Болезни ушей: шум в ушах, понижение слуха, глухота.
- Прочие болезни: снижение остроты зрения с прищуриванием, затуманивание зрения, паралич мышц одной половины лица, судороги у детей, эпилепсия, маниакальное состояние, малярия.

Сочетание:

- Болезни ручного тай-инь канала легких: Тай-юань P.9, Пянь-ли GI.6 (метод сочетания точек первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружно-внутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин-гость»).
- Шум в ушах: Бай-хуэй VG.20, Хань-янь VB.4, Лу-си TR.19, Тянь-чуан IG.16, Да-лин MC.7, Пянь-ли GI.6, Цянь-гу IG.2, Хоу-си IG.3.
- Маниакальное состояние с речевым возбуждением, шум в ушах, паралич мышц одной половины лица, отечность щек; при избытке — понижение слуха, кариес, воспаление горла, зубная боль, насморк, носовое кровотечение; при недостатке — ревматизм: Гэ-шу V.17, Пянь-ли GI.6.
- Воспаление горла, сухость в горле: Да-лин MC.7, Пянь-ли GI.6.
- Судороги у детей: Ле-цюэ P.7, Пянь-ли GI.6.
- Шум в ушах: Цянь-гу IG.2, Хоу-си IG.3, Пянь-ли GI.6, Да-лин MC.7.
- Кариес: Ли-дуй E.45, Сянь-цзянь GI.3, Чун-ян E.42, Пянь-ли GI.6, Сяо-хай IG.8, Хэ-гу GI.4, Нэй-тин E.44, Фу-лю R.7.
- Ощущение жара в голове с носовым кровотечением: Чжун-вань VC.12, Сянь-цзянь GI.3, Пянь-ли GI.6, Ли-дуй E.45, Чэн-цзинь V.56, Цзин-гу V.64, Кунь-лунь V.60, Чэн-шань V.57, Фэй-ян V.58, Инь-бай RP.1.
- Прозрачные водянистые выделения из носа, носовое кровотечение: Пянь-ли GI.6, Хэ-гу GI.4, Эр-цзянь GI.2, Кунь-лунь V.60, Цзу-тун-гу V.66.
- Шум в ушах: Пянь-ли GI.6, Ян-си GI.5, Шан-ян GI.1, Ло-цюэ V.8, Вань-гу IG.4, Цянь-гу IG.2.
- Сухость в горле: Ци-цюань C.1, Тай-юань P.9, Пянь-ли GI.6, Тай-чун F.3, Тянь-ту VC.22.
- Боль в верхних конечностях, паралич мышц одной половины лица: Пянь-ли GI.6, Хэ-гу GI.4.

Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3 цуня или наклонное укалывание на глубину 0,3—0,5 цуней. Прижигание: 3—5 конусов.

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан толстой кишки \(GI\)](#) | Добавил: [admin](#) (11.06.2010) Просмотров: **7657** | Комментарии: **3**
 Всего комментариев: **3**

Порядок вывода комментариев:

- 3 ferti1** (23.12.2016 11:43) ^ 0 v
 С этой точкой сложности. На видео не понятно где эта точка. В конце рука закрывает всё и не понятно местонахождение этой точки.
- 2 verakashicyna** (08.08.2016 19:13) ^ 0 v
 Для нахождения точки часто применяется следующий способ: пациент скрещивает руки через промежутки между большими и указательными пальцами. Точка Пянь-ли GI.6 находится в углублении на уровне кончика среднего пальца.
 Не получается и 3 цуня, и на кончике среднего пальца. Скорее всего верное местонахождение 3 цуня от янси
- 1 verakashicyna** (29.02.2016 19:37) ^ 0 v
 на уровне кончика указательного пальца, судя по картинке

Имя *:

Email:

Код *:

Смотрите также

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| V58 Фэй-ян -
Меридиан мочевого
пузыря (V) | S3 Шао-хай -
Меридиан сердца
(C) | F3 Тай-чун -
Меридиан печени |
|---|--|---------------------------------|

