



## Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти



[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

- Меридиан легких (P) [11]
- Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- Меридиан желудка (E) [45]
- Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- Меридиан сердца (C) [9]
- Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- Меридиан почек (R) [27]
- Меридиан перикарда (MC) [9]
- Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- Меридиан печени (F) [14]
- Задний срединный меридиан (VG) [28]
- Передний срединный меридиан (VC) [24]
- Внеканальные точки PC [175]
- Новые точки [110]
- Дополнительные материалы [18]

Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан тонкой кишки \(IG\)](#)


IG4 Вань-гу

**Первое упоминание:** канон «Лин шу».

**Классификация:** точка первичной Ци ручного тай-ян канала тонкого кишечника.

**Название:** «вань» — «запястье»; «гу» — «кость». «Вань-гу» - древний анатомический термин, обозначающий восемь костей (гу) области запястья (вань), возле которых расположена эта точка.

**Другие названия:** -



**Локализация:** на локтевом крае ладони, в углублении между основанием V пястной кости и трехгранной костью.

**Функции:**


- Согласно многочисленным записям в древних источниках, основным показанием к применению точки Вань-гу IG.4 является желтуха со свойствами сырости-жара. В качестве важнейшей функции точки обычно указывается устранение сырости-жара. С сыростью-жаром связана и другая важная функция точки — «распрямление мышц и сухожилий», то есть точку можно использовать при судорогах мышц, мышечной слабости, чувстве онемения мышц, боли в суставах и мышцах, причиной которых, как правило, является скопление сырости-жара.
- Вань-гу IG.4 точка первичной Ци ручного тай-ян канала тонкого кишечника, может применяться при некоторых нарушениях в фу-органах - отсутствии вкусовых ощущений, утрате чувства меры при приеме пищи, переизбытке, диабете.
- Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяин-гость» при лечении болезней ручного тай-ян канала тонкого кишечника можно применять сочетание точек Вань-гу IG.4 и Тун-ли C.5. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукальвания и прижигания, 1601 г.) говорится:

*«Неужели же болезни [канала] тонкого кишечника безвредны? Отечность щек, боль в надплечьях и наружной поверхности рук напряжение мышц и боль в шее, когда невозможно поворачивать голову в стороны, необычайная боль и отечность в подчелюстной области, выворачивает плечи и выламывает руки, возникают болезни: глухота и пожелтение глаз, боль в задней части наружной поверхности рук и локтей. Правильным будет использование Вань-гу [IG.4] и Тун-ли [C.5].»*

- Ручной тай-ян канал тонкого кишечника имеет наружно-внутреннюю связь с ручным шао-инь каналом сердца. Вань-гу IG.4 - точка первичной Ци ручного тай-ян канала тонкого кишечника, ее можно использовать при некоторых заболеваниях сердца и расстройствах жизненного духа Шэнь, который хранится в сердце, — подавленности настроения, маниакальном состоянии с речевым возбуждением, раздражительности.
- Ветви ручного тай-ян канала тонкого кишечника достигают наружного и внутреннего углов глаза, поэтому многие точки этого канала используются при лечении болезней глаз. Точка Вань-гу IG.4 может применяться при лечении бельма и слезотечения на холоде.

**Показания:**

- Болезни со свойствами сырости-жара: желтуха, шум в ушах, снижение слуха, глухота, боль в подреберье, судороги мышц, мышечная слабость, чувство онемения мышц, боль в суставах и мышцах.
- Болезни ручного тай-ян канала тонкого кишечника: снижение слуха, глухота, желтушность склер, боль и отечность слизистой оболочки горла, отечность в подчелюстной области, боль в шее, судороги и ограничение подвижности пальцев, чувство онемения в кисти и предплечье, ограничение подвижности в локтевом суставе, боль в кисти, запястье, предплечье, надплечье и спине.
- Болезни фу-органов: отсутствие вкусовых ощущений, утрата чувства меры при приеме пищи, переизбыток, диабет.
- Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: подавленность настроения, маниакальное



uCoz 4 582 680  
 Hits: 2 965  
 Hosts: 465

Онлайн всего: **14**  
 Гостей: **13**  
 Пользователей: **1**  
[Roberttop](#)

состояние с речевым возбуждением, раздражительность.

- Болезни глаз: бельмо, слезотечение на холоде.
- Прочие болезни: лихорадочные состояния без пота, судороги у детей, малярия, носовое кровотечение.

**Сочетания**

- Болезни ручного тай-ян канала тонкого кишечника: Вань-гу IG.4, Тун-ли С.5 (метод сочетания точек первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружно-внутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин-гость»).
- Боль в запястье: Вань-гу IG.4, Цянь-гу IG.2, Цюй-чи GI.11, Ян-гу IG.5.
- Судороги и ограничение подвижности пальцев: Вань-гу IG.4, Чжун-чжу TR.3.
- Боль в подреберье, когда трудно дышать: Вань-гу IG.4, Ян-гу IG.5.
- Отечность области шеи, боль затылочных мышц: Тянь-жун IG.17, Цянь-гу IG.2, Цзяо-сунь TR.20, Вань-гу IG.4, Чжи-чжэн TG.7.
- Напряжение и боль затылочных мышц: Шао-цзэ IG.1, Цянь-гу IG.2, Хоу-си IG.3, Вань-гу IG.4, Ян-гу IG.5, Сяо-хай IG.8, Кунь-лунь V.60, Цуань-чжу V.2.
- Маниакальное состояние с речевым возбуждением: Чжи-чжэн IG.7, Юй-цици P. 10, Хэ-гу GI.4, Шао-хай С.3, Цюй-чи GI.11, Вань-гу IG.4.
- Шум в ушах: Пянь-ли GI.6, Ян-си GI.5, Шан-ян GI.1, Ло-цюэ V.8, Вань-гу IG.4, Цянь-гу IG.2.
- Чувство онемения в кисти и предплечье: Тянь-цзин TR.10, Цюй-чи GI.11, Вай-гуань TR.5, Цзин-цюй P.8, Чжи-гоу TR.6, Ян-си GI.5, Вань-гу IG.4, Шан-лянь GI.9, Хэ-гу GI.4.
- Покраснение и отек верхней конечности, боль в суставах: Чжоу-ляо GI.12, Цзянь-юй GI.15, Вань-гу IG.4.
- Переутомление локтя: Тянь-цзин TR.10, Цюй-чи GI.11, Цзянь-ши MC.5, Ян-си GI.5, Чжун-чжу TR.3, Ян-гу IG.5, Тай-юань P.9, Вань-гу IG.4, Ле-цюэ P.7, Е-мэнь TR.2.
- Боль в надплечье и спине: Фэн-мэнь V.12, Цзянь-цзин VB.21, Чжун-чжу TR.3, Чжи-гоу TR.6, Хоу-си IG.3, Вань-гу IG.4, Вэй-чжун V.40.
- Слезотечение на холоде: Цзин-мин V.1, Тоу-линь-ци VB.15, Фэн-чи VB.20, Вань-гу IG.4.
- Лихорадочные состояния без пота: Шан-ян GI.1, Хэ-гу GI.4, Ян-гу IG.5, Ся-си VB.43, Ли-дуй E.45, Лао-гун MC.8, Вань-гу IG.4.
- Раздражительность: Шэнь-мэнь С.7, Ян-си GI.5, Юй-цици P.10, Вань-гу IG.4, Шао-шан P.11, Цзе-си E.41, Гун-сунь RP.4, Тай-бай RP.3, Чжи-инь V.67.
- Боль в реберной области: Ян-гу IG.5, Вань-гу IG.4, Чжи-гоу TR.6, Гэ-шу V.17, Шэнь-май V.62.
- Желтуха: Вань-гу IG.4, Чжи-ян VG.9.
- Боль в предплечье и кисти: Шоу-сань-ли GI.10, Вань-гу IG.4, Чжоу-ляо GI.12, Чжун-чжу TR.3.
- Недостаток Ци селезенки с желтухой: Вань-гу IG.4, Чжун-вань VC.12.
- Диабет: Вань-гу IG.4, Цзу-сань-ли E.36, Пи-шу V.20.
- Шум в ушах и глухота: Вань-гу IG.4, Тун-ли С.5, Тин-гун IG.19, И-фэн TR.17.

**Техника:** перпендикулярное укалывание на глубину 0,3—0,5 цуня. Прижигание: 3—4 конуса.

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан тонкой кишки \(IG\)](#) | Добавил: [admin](#) (13.02.2010) Просмотров: **8905**

Всего комментариев: **0**

Имя \*:

Email:

Код \*:

Ответ

**ШЕСТЬ + 19**

[- Добавить комментарий -](#)

Смотрите также

Меридиан мочевого пузыря (V)

С5 Тун-ли - Меридиан сердца (С)

Меридиан желчного пузыря (VB)

Relap