



Акупунктура и иглокальвание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

[запомнить](#)

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

- Меридиан легких (P) [11]
- Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- Меридиан желудка (E) [45]
- Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- Меридиан сердца (C) [9]
- Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- Меридиан почек (R) [27]
- Меридиан перикарда (MC) [9]
- Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- Меридиан печени (F) [14]
- Задний срединный меридиан (VG) [28]
- Передний срединный меридиан (VC) [24]
- Внеканальные точки PC [175]
- Новые точки [110]
- Дополнительные материалы [18]

Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан селезенки – поджелудочной железы \(RP\)](#)



RP6 Сянь-инь-цзяо

Классификация: точка пересечения трех ножных Инь-каналов — ножного тай-инь канала селезенки, ножного цзяэ-инь канала печени и ножного шао-инь канала почек.

Название: «сянь» — «три»; «инь» — «Инь-каналы»; «цзяо» — «пересечение». В этой точке пересекаются три ножных Инь-канала (селезенки, печени и почек), поэтому она и называется «пересечение трех Инь».

Другие названия:

- Тай-инь.
- Чэн-мин.



Локализация: на 3 цуня выше вершины медиальной лодыжки, у заднего края медиальной поверхности большеберцовой кости.

Функции:


Сянь-инь-цзяо RP.6 — точка пересечения ножного тай-инь канала селезенки, ножного цзяэ-инь канала печени и ножного шао-инь канала почек, то есть трех ножных Инь-каналов. Она является важнейшей точкой, которая содействует восполнению Инь и крови, может использоваться при лечении разнообразных заболеваний селезенки, печени и почек, а также болезней, связанных с ходом трех ножных Инь-каналов. Другими словами, пересечение трех ножных Инь-каналов в точке Сянь-инь-цзяо RP.6 определяет ее основные функции.

1. В Сянь-инь-цзяо RP.6 пересекаются три Инь-канала, поэтому одной из основных функций этой точки является восполнение Инь. Она может использоваться при разнообразных заболеваниях, связанных с недостатком Инь, например, при головокружении, сердцебиении, поллюциях, маточных кровотечениях со свойствами недостатка Инь.

2. Сянь-инь-цзяо RP.6 - одна из ключевых точек ножного тай-инь канала селезенки, способствует укреплению и восполнению Ци селезенки. Селезенка управляет транспортировкой и трансформацией очищенных питательных веществ. Ослабление этой функций селезенки может привести к различным расстройствам пищеварения. Кроме того, транспортировка и трансформация очищенных питательных веществ селезенкой тесно связана с функцией печени по обеспечению свободной циркуляции Ци. Когда печень поддерживает свободную циркуляцию Ци, поднимающая функция селезенки и опускающая функция желудка согласованы, обеспечивая нормальное пищеварение. Укрепление и восполнение Ци селезенки путем воздействия на точку Сянь-инь-цзяо RP.6 способствует нормализации функций селезенки и печени, поэтому точку можно использовать при различных нарушениях пищеварения — вздутии живота, урчании в животе, жидком стуле, поносе, рвоте, понижении аппетита.

3. Достаточное количество очищенных питательных веществ, образующихся при помощи функций селезенки, — необходимое условие для образования крови, хранящейся в печени. Печень хранит кровь, а селезенка контролирует кровь. Нормальная циркуляция крови возможна только при согласованности функций селезенки и селезенки. Воздействие на точку Сянь-инь-цзяо RP.6 способствует нормализации функций селезенки и печени, поэтому точку можно применять при различных нарушениях, связанных с недостатком или застоём крови, например, при бессоннице, головной боли, запоре, аменорее из-за недостатка крови, боли в эпигастриальной области, головной боли, аменорее из-за застоя крови.

4. Почки — главный орган водного обмена. Селезенка управляет транспортировкой и трансформацией сырости, также содействует водному обмену. Ослабление Ци селезенки может привести к нарушению водного обмена, скоплению сырости и образованию патогенной флегмы. В Сянь-инь-цзяо RP.6 пересекаются ножной тай-инь канал селезенки и ножной шао-инь канал почек, поэтому использование точки способствует укреплению селезенки и почек, устранению различных нарушений водного обмена. Точка часто применяется при лечении водянки, отеков, гонореи, желтухи, задержки мочи, затрудненного мочеиспускания,



4581815
Hits: 2100
Hosts: 343

Онлайн всего: **18**

Гостей: **17**

Пользователей: **1**

[EdwinRhype](#)



недержания мочи.

5. Селезенка является «корнем приобретенного», а почки — «корнем врожденного». Квинтэссенция Цзин почек требует постоянного пополнения очищенными питательными веществами, образованными при помощи функции селезенки. При нехватке Ян селезенки происходит внутреннее скопление Инь-холода, в результате повреждается Ян почек, возникает недостаток Ян почек. Сянь-инь-цзяо RP.6 — одна из самых эффективных точек лечения болезней половой сферы, связанных с недостатком Ян почек, таких как дисменорея, аменорея, альгоменорея, маточные кровотечения, бели, бесплодие, выпадение матки, поллюции, преждевременная эякуляция, импотенция.

6. Селезенка управляет мышцами, печень — сухожилиями, почки — костями. Сянь-инь-цзяо RP.6 — точка пересечения каналов этих трех органов, является важной точкой лечения болезней опорно-двигательного аппарата.

7. Согласно многочисленным записям в древних письменных источниках, укальвание точки Сянь-инь-цзяо RP.6 способствует возбуждению родовой деятельности при беременности. Укальвание точек Сянь-инь-цзяо RP.6 и Хэ-гу GI.4 — традиционный метод лечения при перенашивании беременности, может применяться в родах при слабости родовой деятельности и при поперечном положении плода. В других случаях использование указанных точек при беременности строго противопоказано. Их можно использовать при некоторых нарушениях менструального цикла — аменорее и альгоменорее.

Показания:

- Болезни ножного тай-инь канала селезенки: скованность и боль корня языка, вздутие живота, отрыжка, боль в эпигастриальной области, рвота, понос, желтуха, беспокойство, бессонница, общие двигательные нарушения.
- Болезни пищеварения: вздутие живота, урчание в животе, жидкий стул, понос, рвота, понижение аппетита.
- Болезни крови: бессонница, головная боль, запор и аменорея из-за недостатка крови, боль в эпигастриальной области, головная боль и аменорея из-за застоя крови.
- Болезни водного обмена: водянка, отеки, гонорея, желтуха, задержка мочи, затрудненное мочеиспускание, недержание мочи.
- Заболевания половой сферы: дисменорея, аменорея, альгоменорея, обильные менструации, маточные кровотечения, бели, бесплодие, выпадение матки, задержка плаценты, слабость родовой деятельности в родах, кровотечения в послеродовом периоде, послеродовой шок, боль в половых органах, поллюции, преждевременная эякуляция, импотенция.
- Болезни опорно-двигательного аппарата: слабость и паралич нижних конечностей, боль в голени, коленном и тазобедренном суставах.

Сочетание:

- Понос с выделением остатков непереваренной пищи: Сянь-инь-цзяо RP.6, Инь-лин-цюань RP.9.
- Рвота водянистым содержимым после приема пищи: прижигание Фэй-шу V.13, Сянь-инь-цзяо KP.6, Ци-инь F.14.
- Похолодание голени с бессонницей: Ли-дуй E.45, Тяо-коу E.38, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Боль в тазобедренном суставе: Хуань-тяо VB.30, Шу-гу V.65, Цзяо-синь R.8, Сянь-инь-цзяо RP.6, Инь-гу R.10.
- Боль в тазобедренном суставе, вызывающая затруднения при ходьбе, боль в наружной поверхности стопы: Цзу-линь-ци VB.41, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Дисменорея: Чжун-ци VC.3, Шэнь-шу V.23, Пи-хай VC.6, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Задержка плаценты: Чжун-ци VC.3, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Аменорея: Чжун-ци VC.3, Шэнь-шу V.23, Хэ-гу GI.4, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Слабость и боль в половом члене: сначала укальвание Чжун-ци VC.3, Тай-си R.3, Фу-лю R.7, Сянь-инь-цзяо RP.6, затем укальвание Сюэ-хай RP.10, Чжун-ци VC.3, Хуэй-инь VC.1, Нэй-гуань MC.6, Инь-лин-цюань RP.9.
- Маточные кровотечения: Цзяо-синь R.8, Инь-гу R.10, Тай-чун F.3, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Бели: Дай-май VB.26, Гуань-юань VC.4, Ци-хай VC.6, Сянь-инь-цзяо RP.6, Бай-хуань-шу V.30, Цзянь-ши MC.5.
- Обильные менструации: Тун-ли C.5, Син-цзянь F.2, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Маточные кровотечения: Ци-хай VC.6, Да-дунь F.1, Инь-гу R.10, Тай-чун F.3, Жань-гу R.2, Сянь-инь-цзяо RP.6, Чжун-ци VC.3.
- Дисменорея: Цзу-линь-ци VB.41, Сянь-инь-цзяо RP.6, Чжун-ци VC.3.
- Дисменорея: Ци-хай VC.6, Чжун-ци VC.3, Дай-май VB.26, Шэнь-шу V.23, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Покраснение, опухание и боль наружных половых органов у женщин: Хуэй-инь VC.1, Чжун-ци VC.3, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Трудные роды: Хэ-гу GI.4 (стимуляция), Сянь-инь-цзяо RP.6 (седатация), Тай-чун F.3.
- Кровотечения в послеродовом периоде с выделением сгустков крови и болью: Ци-хай VC.6, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Послеродовой шок: Чжи-гоу TR.6, Цзу-сань-ли E.36, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Боль в половом члене: Тай-си R.3, Юй-ци P.10, Чжун-ци VC.3, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Поллюции: Шэнь-шу V.23, Гуань-юань VC.4, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Затрудненное мочеиспускание: Инь-лин-цюань RP.9, Ци-хай VC.6, Сянь-инь-цзяо RP.6, Инь-гу R.10, Да-лин MC.7.
- Боль выше лодыжки: прижигание Сянь-инь-цзяо RP.6, Сюань-чжун VB.39, Кунь-лунь V.60.
- Скованность языка: Тай-юань P.9, Хэ-гу GI.4, Нэй-тин E.44, Кунь-лунь V.60, Сянь-инь-цзяо RP.6, Фэн-фу VG.16.
- Беспокойство, бессонница: Тай-юань P.9, Гун-сунь RP.4, Инь-бай RP.1, Фэй-шу V.13, Инь-лин-цюань RP.9, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Отечность всего тела с нарывами: Цюй-чи GI.11, Хэ-гу GI.4, Цзу-сань-ли E.36, Сянь-инь-цзяо RP.6, Син-цзянь F.2, Нэй-тин E.44.
- Аномальное поднятие Ци: Чи-цзэ P.5, Шан-цю RP.5, Тай-бай RP.3, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Холод и жар в животе: Шао-чун C.9, Шан-цю RP.5, Тай-чун F.3, Син-цзянь F.2, Сянь-инь-цзяо RP.6, Инь-бай RP.1, Инь-лин-цюань RP.9.
- Бери-бери из-за холода-сырости: сначала укальвание Цзу-сань-ли E.36 и Сянь-инь-цзяо RP.6, затем укальвание Сюань-чжун VB.39.
- Слабость и боль в стопе, вызывающая затруднения при ходьбе: Вэй-чжун V.40, Сянь-инь-цзяо RP.6.
- Грыжа: Сянь-инь-цзяо RP.6, Гуй-лай E.29, Тай-чун F.3.
- Ночное недержание мочи: Сянь-инь-цзяо RP.6, Гуань-юань VC.4.
- Дисменорея, альгоменорея: Сянь-инь-цзяо RP.6, Сюэ-хай RP.10, Ци-хай VC.6, Гуань-юань VC.4, Чжи-гоу TR.6.
- Боль в нижней части живота после менструации: Сянь-инь-цзяо RP.6, Гуань-юань VC.4.
- В родах при поперечном положении плода: Сянь-инь-цзяо RP.6, Шэнь-шу V.23, Хэ-гу GI.4.

Техника: перпендикулярное укальвание на глубину 0,5—1 цунь или пронизывание по направлению к точке Сюань-чжун VB.39 на глубину 1—2 цуня. Прижигание: 3-6 конусов. При беременности укальвание точки противопоказано.

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан селезенки – поджелудочной железы \(RP\)](#) | Добавил: [admin](#) (17.07.2009) Просмотров: **24237**

Всего комментариев: **0**

Имя *:

Email

Ж К Ч

Код *:

Ответ

Трех + 57

Добавить комментарий

Смотрите также

V58 Фэй-ян -
Меридиан мочевого
пузыря (V)

VB32 Чжун-ду -
Меридиан желчного
пузыря (VB)

IG18 Цюань-ляо -
Меридиан тонкой
кишки (IG)

Relap