



Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

Меридиан легких (P) [11]

Меридиан толстой кишки (GI) [20]

Меридиан желудка (E) [45]

Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]

Меридиан сердца (C) [9]

Меридиан тонкой кишки (IG) [19]

Меридиан мочевого пузыря (V) [67]

Меридиан почек (R) [27]

Меридиан перикарда (MC) [9]

Меридиан трех частей туловища (TR) [23]

Меридиан желчного пузыря (VB) [44]

Меридиан печени (F) [14]

Задний срединный меридиан (VG) [28]

Передний срединный меридиан (VC) [24]

Внеканальные точки PC [175]

Новые точки [110]

Дополнительные материалы [18]

Статистика


[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан мочевого пузыря \(V\)](#)

V17 Гэ-шу

Классификация: одно из «восьми средоточий» — «средоточие крови».

Название: «гэ» — «диафрагма»; «шу» — «шу-точка спины». Шу-точки спины — это двенадцать точек канала мочевого пузыря, расположенных на спине на 1,5 цуня от срединной линии, куда вливается Ци соответствующих цзанфу-органов. Точка Гэ-шу V.17 находится между шу-точками спины цзанфу-органов. Считается, что внутри ей соответствует диафрагма, однако она не относится к двенадцати шу-точкам спины, так как диафрагма не является цзанфу-органом.

Другие названия: -



Локализация: на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком VII грудного позвонка.

Функции:

1. Точка Гэ-шу V.17 — одно из «восьми средоточий» — «средоточие крови». Точка расположена между шу-точкой спины сердца Синь-шу V.15 и шу-точкой спины печени Гань-шу V.18. Сердце управляет кровью, печень хранит кровь. Точку можно использовать при всех болезнях, связанных с кровью, то есть при недостатке крови, застое крови, холоде или жаре в крови. Наибольшая эффективность лечения достигается путем сочетания точки Гэ-шу V.17 с «морем крови» — точкой Сюэ-хай RP.10.

2. Гэ-шу V.17 способствует оживлению крови, поэтому ее использование может быть воплощением принципа: «При восприятии ветра сначала лечите кровь. Когда нормализуется циркуляция крови, ветер сам собою исчезнет». Примерами могут служить боль в суставах и крапивница, вызванные восприятием внешнего патогенного ветра. Точка Гэ-шу V.17 эффективна в лечении этих болезней. В данных случаях также рекомендуется применять сочетание точек Гэ-шу V.17 и Сюэ-хай RP.10.


3. Гэ-шу V.17 соотносится с диафрагмой, поэтому может использоваться при лечении икоты, затрудненного глотания и рвоты. Гэ-шу V.17 — одна из важнейших точек лечения икоты. Может применяться при всех разновидностях этой болезни, то есть при икоте из-за холода, жара, скопления флегмы, недостатка Ян селезенки и почек или недостатка Инь желудка.

4. В книге «Чжун го чжэнь цюэ сюэ» (Паука иглоукальвания и прижигания Китая, 1955 г.) Гэ-шу V.17 отнесена к группе «шести точек для прижигания». Здесь говорится:

«Две точки Гэ-шу [V.17], две точки Гань-шу [V.18], две точки Пи-шу [V.20] — всего шесть точек — называются „шестью для прижигания“. На каждой прижигают от 7 до 15 конусов. Лечат гастрэк-газию, гастроспазм, рак желудка, энтерит, снижение аппетита, расстройства пищеварения, спазм диафрагмы, астму, плеврит».

Показания:

- Болезни из-за недостатка крови: бессонница, головокружение, сердцебиение, онемение конечностей, альгоменорея, бесплодие.
- Болезни из-за застоя крови: боль в области сердца с иррадиацией в спину, боль в подреберье, боль в эпигастральной области, боль в пояснице, боль и ограничение подвижности в суставах, вздутие живота, затрудненное глотание, кровохарканье, ощущение сдавленности грудной клетки, сумасшествие, аменорея, альгоменорея, маточные кровотечения.
- Болезни из-за жара в крови: дисменорея, маточные кровотечения, бесплодие.
- Болезни диафрагмы: икота, затрудненное глотание, рвота.
- Болезни со свойствами ветра: боль в суставах, крапивница.



uCoz 4585 922
 Hits: 215
 Hosts: 21

Онлайн всего: **3**
 Гостей: **3**
 Пользователей: **0**

- Болезни ножного тай-ян канала мочевого пузыря: носовое кровотечение, геморрой, сумасшествие, боль в спине, напряжение мышц спины и позвоночника.
- Прочие болезни: одышка, кашель, приливы жара, ночные поты.

Сочетания:

- Маниакальное состояние с речевым возбуждением, шум в ушах, паралич мышц одной половины лица, отечность щек; при избытке — понижение слуха, кариес, воспаление горла, зубная боль, насморк, носовое кровотечение; при недостатке — ревматизм: Гэ-шу V.17, Пянь-ли GI.6.
- Напряжение мышц спины и позвоночника, лихорадка с потом: Гэ-шу V.17, И-си V.45 [6].
- Сумасшествие: Гэ-шу V.17, Гань-шу V.18.
- Рвота съеденной пищей: Гэ-шу V.17, прижигание Чжан-мэнь F.13, Чжун-вань VC.12.
- Вздутие живота, резкая боль в животе: Гэ-шу V.17, Инь-гу R.10.
- Воспаление горла, отечность слизистой оболочки горла, ощущение инородного тела в гортани: Тянь-дин GI.17, Ци-шэ E.11, Гэ-шу V.17.
- Напряжение мышц позвоночника: Чжан-мэнь F.13, Гэ-шу V.17, Вэй-цан V.50, Да-чан-шу V.25.
- Вздутие живота: Чжун-люй-шу V.29, И-шэ V.49, Гэ-шу V.17.
- Тошнота: прижигание Вэй-шу V.21, Ю-мэнь R.21, Шан-цю RP.5, Чжун-фу P.1, Ши-мэнь VC.5, Гэ-шу V.17, Си-ян-гуань VB.33.
- Рвота съеденной пищей: сначала Ся-вань VC.10, затем Цзу-сань-ли E.36 (седатация), Шэнь-шу V.23, Гэ-шу V.17 (прижигание 100 конусами), Чжун-вань VC.12, Пи-шу V.20.
- Боль в эпигастральной области: Тай-юань P.9, Юй-ци P.10, Цзу-сань-ли E.36, Жу-ся VT, Гэ-шу V.17, Вэй-шу V.21, Шэнь-шу V.23.
- Боль в реберной области: Ян-гу IG.5, Вань-гу IG.4, Чжи-гоу TR.6, Гэ-шу V.17, Шэнь-май V.62.
- Затруднение глотания: Тянь-ту VC.22, Ши-гуань R.18, Цзу-сань-ли E.36, Вэй-шу V.21, Чжун-вань VC.12, Гэ-шу V.17, Шуй-фэнь VC.9, Ци-хай VC.6, Вэй-цан V.50.
- Болезни из-за скопления флегмы-жидкости: Гэ-шу V.17, Гао-хуан V.43.
- Рвота съеденной пищей: Гэ-шу V.17, Пи-шу V.20, Гао-хуан V.43.
- Анемия: Гэ-шу V.17, Да-чжуй VG.14, Пи-шу V.20, Си-мэнь MC.4, Сюэ-хай RP.10, Цзу-сань-ли E.36.

Техника: наклонное укалывание книзу на глубину 0,5 цуня или наклонное укалывание по направлению к позвоночнику. Не следует производить глубокое укалывание во избежание повреждения внутренних органов. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 - 15 минут мокса-сигаретой.

Примечание: в книгах «Лэй цзин» (Упорядоченный Канон [Желтого императора о внутреннем], 1624 г.) и «И цзун цзинь цзянь» (Золотое зеркало медицины, 1749 г.) говорится, что точка Гэ-шу V.17 расположена на 2 цуня кнаружи от задней срединной линии.

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан мочевого пузыря \(V\)](#) | Добавил: [admin](#) (27.07.2009) Просмотров: **9794** | Комментарии: **2**

Всего комментариев: **0**

Имя *:

Email:

Код *:

Смотрите также

- | | | |
|--|--|---|
| RP5 Шан-цю -
Меридиан селезенки
– поджелудочной... | VC17 Тань-чжун -
Передний
срединный... | VC23 Лянь-цюань
Передний
срединный... |
|--|--|---|

Relap