



# Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

Категории раздела

- Меридиан легких (P) [11]
- Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- Меридиан желудка (E) [45]
- Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- Меридиан сердца (C) [9]
- Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- Меридиан почек (R) [27]
- Меридиан перикарда (MC) [9]
- Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- Меридиан печени (F) [14]
- Задний срединный меридиан (VG) [28]
- Передний срединный меридиан (VC) [24]
- Внеканальные точки PC [175]
- Новые точки [110]
- Дополнительные материалы [18]

Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан мочевого пузыря \(V\)](#)

V18 Гань-шу

**Название:** «гань» — «печень»; «шу» — «шу-точка спины». Гань-шу V.18 — шу-точка спины печени, место скопления Ци печени, важная точка лечения болезней печени.

**Другие названия:** —



**Локализация:** на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком IX грудного позвонка.



**Функции:**

1. Гань-шу V.18 — шу-точка спины печени, важная точка лечения и диагностики болезней печени. Укальвание и прижигание точки можно производить при всех патологических изменениях в печени. Пальпация точки часто применяется при диагностике болезней печени.
2. Гань-шу V.18 - шу-точка спины печени, одна из самых эффективных точек лечения болезней глаз. Печень открывается в глаза, поэтому состояние печени обычно отражается на глазах. Так, — недостаток Инь и крови печени вызывает сухость глаз, снижение остроты зрения и нарушение сумеречного зрения; возгорание огня печени — покраснение глаз и бельмо; активация Ян печени — затуманивание зрения; активация ветра в печени косоглазие. Кроме того, ножной тай-ян канал мочевого пузыря, к которому относится точка, начинается у внутреннего угла глаза, многие точки этого канала используются при лечении болезней глаз. Это объясняет исключительную эффективность точки Гань-шу V.18 в лечении разнообразных глазных болезней.
3. Гань-шу V.18 шу-точка спины печени. Ножной цзюэ-инь канал печени имеет наружно-внутреннюю взаимосвязь с ножным шао-ян каналом желчного пузыря. Нарушения функций печени обычно вызывают нарушения в желчном пузыре, и наоборот. Как правило, оба органа повреждаются одновременно, возникают комплексные синдромы, такие как «сырость-жар в печени и желчном пузыре» с ощущением распирания и болью в подреберье, горечью во рту, снижением аппетита, тошнотой, рвотой, вздутием живота, при лечении которых можно использовать точку Гань-шу V.18.
4. В книге «Чжун го чжэнь цзю сюэ» (Наука иглоукальвания и прижигания Китая, 1955 г.) Гань-шу V.18 отнесена к группе «шести точек для прижигания». Здесь говорится:

*«Две точки Гэ-шу [V.17], две точки Гань-шу [V.18], две точки Пи-шу [V.20] — всего шесть точек — называются „шестью для прижигания“. На каждой прижигают от 7 до 15 конусов. Лечат гастрэктазию, гастростаз, рак желудка, энтерит, снижение аппетита, расстройство пищеварения, спазм диафрагмы, астму, плеврит».*

**Показания:**

- Застой Ци печени: приступы гнева, ощущение распирания и боль в подреберье, боль в животе, дисменорея, альгоменорея.
- Возгорание огня печени: головная боль распирающего характера, головокружение, боль в глазах, покраснение глаз, бельмо, горечь во рту, сухость в горле, раздражительность, приступы гнева, чувство жжения и боль в подреберье, шум в ушах, кровохарканье, носовое кровотечение, желтуха.
- Гиперактивность Ян печени: головная боль распирающего характера, головокружение, затуманивание зрения, шум в ушах, покраснение лица и глаз, раздражительность, приступы гнева, бессонница.
- Недостаток крови печени: бледность, головокружение, снижение остроты зрения, сухость глаз, нарушение сумеречного зрения, онемение в конечностях, судороги, аменорея.
- Болезни глаз: снижение остроты зрения, нарушение сумеречного зрения, покраснение глаз, бельмо, глаукома, затуманивание зрения, косоглазие, слезотечение, гноетечение, боль и зуд во внутреннем углу



uCoz 4585 922  
 Hits: 215  
 Hosts: 21

---

Онлайн всего: **3**  
 Гостей: **3**  
 Пользователей: **0**

глаза, конъюнктивит.

- Сырость-жар в печени и желчном пузыре: ощущение распирания и боль в подреберье, горечь во рту, снижение аппетита, тошнота, рвота, вздутие живота.
- Боль в канале мочевого пузыря: головная боль, боль в глазах, слезотечение на ветру, носовое кровотечение, головокружение, сумасшествие, боль в позвоночнике и спине.
- Прочие болезни: кашель, понос, грыжа.

**Сочетание:**

- Все болезни печени: Гань-шу V.18, Ци-мэнь F.14 (метод сочетания шу-точек спины и му-точек живота).
- Понос и боль в подреберье из-за проникновения патогенного холода в канал печени: Гань-шу V.18, Тай-чун F.3.
- Боль в реберной области: Гань-шу V.18, Пи-шу V.20, Чжи-ши V.52.
- Грыжа из-за восприятия патогенного холода с выделением остатков непереваренной нищи: Гань-шу V.18, Чжан-мэнь F.13.
- Слезотечение, гноетечение, покраснение, боль и зуд во внутреннем углу глаза, бельмо: Цзин-мин V.1, Инь-цзю VG.28, Чэн-ци E.1, Сы-бай E.2, Фэн-чи VB.20, Цзюй-ляо E.3, Тун-цзы-ляо VB.1, Шан-син VG.23, Гань-шу V.18.
- Бельмо: Гань-шу V.18, Мин-мэнь VG.4, Тун-цзы-ляо VB.1, Хэ-гу GI.4, Шан-ян GI.1.
- Бельмо: Тоу-линь-ци VB.15, Гань-шу V.18.
- Глаукома: Гань-шу V.18, Шан-ян GI.1 (если слева, — использовать справа, если справа, — использовать слева).
- Слезотечение: Тоу-линь-ци VB.15, Бай-хуэй VG.20, Е-мэнь TR.2, Хоу-си IG.3, Цянь-гу IG.2, Гань-шу V.18.
- Грыжа из-за восприятия патогенного холода с болью в животе: Инь-ши E.33, Тай-си R.3, Гань-шу V.18.
- Кровохарканье, носовое кровотечение: Инь-бай RP.1, Пи-шу V.20, Гань-шу V.18, Шан-вань VC.13.
- Кашель: прижигание Тянь-ту VC.22, Фэй-шу V.13, Цзянь-цин VB.21, Шао-шан P.11, Жань-гу R.2, Гань-шу V.18, Ци-мэнь F.14, Син-цзянь F.2, Лянь-цюань VC.23, Фу-ту GI.18, укалывание Цзюй-цзэ MC.3, Цянь-гу IG.2.
- Похолодание конечностей: прижигание Ци-хай VC.6, Шэнь-шу V.23, Гань-шу V.18.
- Снижение остроты зрения: Гань-шу V.18, Мин-мэнь VG.4.
- Затуманивание зрения из-за недостатка крови печени: Гань-шу V.18 (стимуляция), Цзю-сань-ли E.36 (седатация).
- Болезни глаз: Гань-шу V.18, Мин-мэнь VG.4.
- Бельмо: Шао-цзэ IG.1, Гань-шу V.18.
- Болезни глаз: Гань-шу V.18, Шао-шан P.11, Тоу-вэй E.8, Бай-хуэй VG.20.

**Техника:** наклонное укалывание книзу на глубину 0,5 цуня или наклонное укалывание по направлению к позвоночнику. Не следует производить глубокое укалывание во избежание повреждения внутренних органов. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 15 минут мокса-сигаретой.

**Примечание:** в книгах «Лэй цзин» (Упорядоченный Канон [Желтого императора о внутреннем], 1624 г.) и «И цзун цзин цзянь» (Золотое зеркало медицины, 1749 г.) говорится, что точка Гань-шу V.18 расположена на 2 цуня кнаружи от задней срединной линии.

**Автор:** П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан мочевого пузыря \(V\)](#) | Добавил: [admin](#) (26.08.2009) Просмотров: **7987**  
 Всего комментариев: **0**

Имя \*:

Email:

Ж К Ч [иконки]

Код \*:

Смотрите также

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p>RP5 Шан-цю -<br/>Меридиан селезенки<br/>– поджелудочной...</p> | <p>VC17 Тань-чжун -<br/>Передний<br/>срединный...</p> | <p>VC23 Лянь-цюань<br/>Передний<br/>срединный...</p> |
|---|---|--|

Relap