



## Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти

[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

### Форма входа

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

### Категории раздела

- Меридиан легких (P) [11]
- Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- Меридиан желудка (E) [45]
- Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- Меридиан сердца (C) [9]
- Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- Меридиан почек (R) [27]
- Меридиан перикарда (MC) [9]
- Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- Меридиан печени (F) [14]
- Задний срединный меридиан (VG) [28]
- Передний срединный меридиан (VC) [24]
- Внеканальные точки PC [175]
- Новые точки [110]
- Дополнительные материалы [18]

### Статистика

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Меридиан желчного пузыря \(VB\)](#)

### VB2 Тин-хуэй

**Первое упоминание:** «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукальвания и прижигания, 282 г.).

**Классификация:** точка пересечения ножного цiao-ян канала желчного пузыря и ручного шао-ян канала Сянь-цзяо.

#### Название:

- «Тин» — «слух»; «хуэй» — «способность». Точка расположена кпереди от уха, используется при лечении болезней со снижением слуха, восстанавливает «способность слышать».
- «Тин» — «слух»; «хуэй» — «средоточие». Точка расположена кпереди от уха, используется при лечении различных болезней ушей, поэтому сравнивается со «средоточием слуха».

#### Другие названия:

- Эр-мэнь.
- Тин-хэ.



**Локализация:** при открытом рте в углублении кпереди от межжелезковой вырезки, у заднего края мышечного отростка нижней челюсти.

#### Функции:

- Тин-хуэй VB.2 относится к ножному шао-ян каналу желчного пузыря, расположена кпереди от уха, является важной точкой лечения практически всех болезней ушей. Так, причинами возникновения шума в ушах и глухоты могут быть истощение квинтэссенции Цзин почек, возгорание огня печени и желчного пузыря или застой флегмы-жара. В учебных материалах института китайской медицины г. Тяньцзинь при всех трех разновидностях болезни рекомендовано использование точки Тин-хуэй VB.2.
- Согласно записям в древних источниках, точку Тин-хуэй VB.2 можно использовать при некоторых локальных болезнях, таких как асимметрия лица и спазм жевательных мышц, а также при зубной боли.
- Точка Тин-хуэй VB.2 расположена на голове, внутрь от точки в полости черепа — головной мозг. Ли Шичжэнь (1518—1593 г.г.) писал:

«Головной мозг — это дворец первичной Ци и жизненного духа Шэнь».


Точка относится к ножному шао-ян каналу желчного пузыря, который имеет наружно-внутреннюю взаимосвязь с ножным цзюэ-инь каналом печени. Нарушения в печени и желчном пузыре часто становятся причиной расстройств жизненного духа Шэнь. Так, при застое Ци печени может возникнуть депрессия, при возгорании огня печени — маниакальное состояние и апоплексия, при гиперактивности Ян печени — эпилепсия, при внутренней активации ветра печени — судороги. При лечении всех указанных болезней можно использовать точку Тин-хуэй VB.2.

#### Показания:

- Болезни ушей: шум в ушах, снижение слуха, глухота, боль в ухе, гноетечение из уха.
- Локальные болезни: асимметрия лица, спазм жевательных мышц, зубная боль.
- Расстройства жизненного духа Шэнь: депрессия, маниакальное состояние, апоплексия, эпилепсия, судороги.
- Болезни ножного шао-ян канала желчного пузыря: озноб.

#### Сочетание:


- Глухота, пгум в ушах, напоминающий пение цикад: Тянь-жун IG.7, Тин-хуэй VB.2, Тин-гун IG.19, Чжун-чжу



uCoz 4585 808  
 Hits: 101  
 Hosts: 19

---

Онлайн всего: **6**  
 Гостей: **4**  
 Пользователей: **2**  
[inetrvconydot](#),  
[Roberttop](#)



TR.3.

- Зубная боль, озноб: Да-ин E.5, Цюань-ляо IG.18, Тин-хуэй VB.2, Цюй-чи GI.11.
- Маниакальное состояние с двигательным возбуждением, депрессия: Ло-цюэ V.8, Тин-хуэй VB.2, Шэнь-чжу VG.12
- Снижение слуха, глухота: сначала Тин-гун IG.19, Тин-хуэй VB.2, И-фэн TR.17, затем Цзу-сань-ли E.36, Хэ-гу GI.4.
- Снижение слуха: Эр-мэнь TR.21, Фэн-чи VB.20, Ся-си VB.43, И-фэн TR.17, Тин-хуэй VB.2, Тин-гун IG.19.
- Глухота из-за восприятия патогенного холода: Цзинь-мэнь V.63, Тин-хуэй VB.2.
- Снижение слуха, глухота: Тин-хуэй VB.2, И-фэн TR.17.
- Шум в ушах, глухота: Тин-хуэй VB.2, Чжан-мэнь F.13, И-фэн TR.17, Вай-гуань TR.5.
- Апоплексия с асимметрией лица: Тин-хуэй VB.2, И-фэн TR.17, Цзя-чэ E.6, Ди-цан E.4, Шан-гуань VB.3, Ся-гуань E.7.

**Техника:** при открытом рте перпендикулярное укалывание на глубину 0,5 — 1 цунь. Прижигание: 3 — 5 конусов или 3 — 5 минут мокса-сигаретой.


**Автор:** П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"

Категория: [Меридиан желчного пузыря \(VB\)](#) | Добавил: [admin](#) (14.02.2010) Просмотров: **8519**


Всего комментариев: **0**

Имя \*:

Email:



Код \*:



### Смотрите также

Зубная боль -  
 Заболевания  
 полости рта

VB34 Ян-лин-цюань  
 - Меридиан  
 желчного пузыря...

VB43 Ся-си -  
 Меридиан желчног  
 пузыря (VB)

 Relap