



# Акупунктура и иглоукальвание аппаратом "Эледиа"

Найти



[Главная страница](#)

[Купить Эледиа](#)

[Заболевания](#)

[Атлас акупунктурных точек](#)

[Отзывы о приборе Эледиа](#)

[Библиотека](#)

[Справка по прибору](#)

[Форум](#)

[Обратная связь](#)

**Форма входа**

Логин:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

**Категории раздела**

- Меридиан легких (P) [11]
- Меридиан толстой кишки (GI) [20]
- Меридиан желудка (E) [45]
- Меридиан селезенки – поджелудочной железы (RP) [21]
- Меридиан сердца (C) [9]
- Меридиан тонкой кишки (IG) [19]
- Меридиан мочевого пузыря (V) [67]
- Меридиан почек (R) [27]
- Меридиан перикарда (MC) [9]
- Меридиан трех частей туловища (TR) [23]
- Меридиан желчного пузыря (VB) [44]
- Меридиан печени (F) [14]
- Задний срединный меридиан (VG) [28]
- Передний срединный меридиан (VC) [24]
- Внеканальные точки PC [175]
- Новые точки [110]
- Дополнительные материалы [18]

**Статистика**

[Главная](#) » [Статьи](#) » [Атлас акупунктурных точек](#) » [Передний срединный меридиан \(VC\)](#)

**VC4 Гуань-юань**

### Классификация:



- Му-точка живота тонкого кишечника.
- «Сосуд Чун-май начинается в Гуань-юань [VC.4]».
- Точка пересечения сосуда Жэнь-май, ножного тай-инь канала селезенки, ножного шао-инь канала почек и ножного цзюэ-инь канала печени.
- Точка пересечения сосуда Жэнь-май, ножного тай-инь канала селезенки, ножного шао-инь канала почек, ножного цзюэ-инь канала печени и ножного ян-мин канала желудка.

### Название:

- «Гуань» — «ключевой, важный»; «юань» — «первичная Ци». Точка расположена ниже пупка между почками, в месте, где хранится первичная Ци, является ключевой точкой, способствующей восполнению первичной Ци, отсюда и название.
- «Гуань» — «засов; закрывать»; «юань» - «первичная Ци». Точка используется при критических состояниях со свойствами отхождения Ци, «закрывает» первичную Ци внутри организма, не позволяя ей выйти наружу.

### Другие названия:

- Ся-цзи.
- Сань-цзе-цзяо.
- Цы-мэнь.
- Да-чжун-цзи.
- Дань-тянь.
- Сяо-чан-му.



**Локализация:** на передней срединной линии, на 3 цуня ниже пупка.

### Функции:

- Точка Гуань-юань VC.4 относится к сосуду Жэнь-май, расположена ниже пупка, в месте, которое в китайской медицине соотносится с «киноварным полем» (дань тянь). В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится:


*«Движение Ци ниже пупка между почками — это человеческая жизнь, корень двенадцати каналов».*

Ян Сюаньцао (VII в.) комментировал:

*«Движение Ци ниже пупка между почками — это „киноварное поле“ — это корень человека».*

В книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукальвания и прижигания, 282 г.) с «киноварным полем» соотносится точка Ши-мэнь VC.5, в других древних источниках — Ци-хай VC.6 и Гуань-юань VC.4, однако чаще всего с «киноварным полем» связывают точку Гуань-юань VC.4. Точка расположена на животе (живот относится к Инь), является точкой пересечения сосуда Жэнь-май и трех ножных Инь-каналов (тай-инь селезенки, шао-инь почек и цзюэ-инь печени), в то же время тесно связана с Ян-Ци, поэтому ее называют «точкой Ян внутри Инь». Основными функциями Гуань-юань VC.4 являются прогревание почек, укрепление Ян и восполнение первичной Ци, ее можно использовать при всех состояниях с ослаблением Ян-Ци почек и недостатком первичной Ци. В этих случаях обычно производится прижигание точки и очень часто рекомендуется использовать ее в сочетании с Цзю-сань-ли E.36 и Гао-хуан V.43.

- Точка Гуань-юань VC.4 способствует укреплению Ян, поэтому ее использование эффективно при критических состояниях с сильным истощением Ян-Ци, например, при обмороках. Следует помнить, что



4585 707  
Hits: 0  
Hosts: 0

---

Онлайн всего: **11**  
Гостей: **10**  
Пользователей: **1**  
[Roberttop](#)

точка Гуань-юань VC.4 применяется при критических состояниях из-за отхождения Ци, то есть при истощении Ян-Ци и ее неспособности удерживаться внутри организма. В этом случае кисти рук больного разжаты, рот открыт, наблюдается розовая окраска щек, со временем — бледность, недержание кала и мочи, наблюдается стеснение в груди. Данное состояние относится к синдрому типа недостатка. Основным принципом лечения является воздействие «возвращению Ян», обычно рекомендуется применять сочетание точек Гуань-юань VC.4 и Цзу-сань-ли E.36. Критические состояния из-за закупорки Ци относятся к синдрому типа избытка. В этом случае кисти рук больного плотно сжаты, наблюдается стеснение челюстей, покраснение лица, шумное дыхание с влажными хрипами. Данное состояние относится к синдрому типа избытка, в лечении рекомендуется применять сочетание точек Юн-цюань R.1 и Шуй-гоу VG.26.

3. Гуань-юань VC.4 — му-точка живота тонкого кишечника. Основной функцией тонкого кишечника являются отделение «чистого» от «мутного». В книге «И сюэ жу мэн» (Вводный курс медицины, 1575 г.) говорится:

*«Тонкий кишечник сверху соединен с желудком, получает его отходы и переваривает их. Опускает воду в мочевой пузырь, отделяет чистое от мутного».*

Таким образом, основными болезнями тонкого кишечника, для лечения которых можно использовать точку Гуань-юань VC.4, являются нарушения пищеварения, а также расстройство мочеиспускания и дефекации. При лечении можно применять метод сочетания шу-точек спины и му-точек живота, используя Гуань-юань VC.4 и Сяо-чан-шу V.27.

4. Точка Гуань-юань VC.4 относится к сосуду Жэнь-май, расположена в нижней части живота, вблизи половых органов. Кроме того, в каноне «Су вэнь» говорится:

*«Сосуд Чун-май начинается в Гуань-юань [VC.4]».*

Сосуды Жэнь-май и Чун-май относятся к «сосудам матки», тесно связаны с менструальным циклом, беременностью и родами у женщин и хранением квинтэссенции Цзин у мужчин. Важной функцией Гуань-юань VC.4 является нормализация состояния сосудов Жэнь-май и Чун-май, точка проявляет высокую эффективность при лечении разнообразных заболеваний половой сферы. В связи с тем, что сосуд Чун-май является «жилищем крови» и «морем крови», точку можно использовать не только при недостатке Ян-Ци, но и при застое крови (аменорея), недостатке крови (бесплодие), жаре в крови (дисменорея).

5. Укрепление первичной Ци способствует изгнанию внешней патогенной Ци. Гуань-юань VC.4 является эффективной точкой, способствующей укреплению первичной Ци, поэтому она может использоваться при болезнях, вызванных восприятием внешней патогенной Ци. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:

*«Когда патогенная Ци проникает в каналы и коллатерали, не надо принимать лекарства, следует прижигать Ци-хай [VC.6], Гуань-юань [VC.4] и Чжун-вань [VC.12]».*

6. В «Бянь Цзюэ синь шу» (Книга мыслей Бянь Цзюэ, 1146 г.) предложено использование сочетания точек Гуань-юань VC.4 и Ши-доу RP.17 при синдроме типа тай-инь из-за восприятия внешнего патогенного холода. Данный синдром характеризуется недостатком Ци селезенки и внутренним скоплением холода-сырости с чувством переполнения в животе, поносом, рвотой водянистым содержимым, понижением аппетита, болью в животе, стихающей при прогревании и надавливании. Эти же точки рекомендованы при непроизвольной дефекации в преклонном возрасте и дизентерии.

#### Показания:

- Болезни со свойствами недостатка Ян: импотенция, поллюции, ночное недержание мочи, частое мочеиспускание, бели, альгоменорея, маточные кровотечения, выпадение матки, головокружение, шум в ушах, утомляемость, слабость, похудание, боль в пояснице, боль в области сердца, понос, икота.
- Критические состояния: потеря сознания, синдром отхождения при апоплексии, эпилепсия.
- Болезни тонкого кишечника: снижение аппетита, урчание в животе, вздутие живота, боль в животе, понос, дизентерия, недержание мочи, затрудненное мочеиспускание, задержка мочи, кровь в моче, гонорея.
- Болезни половой сферы: альгоменорея, аменорея, бели, бесплодие, выпадение матки, дисменорея, задержка плаценты, маточные кровотечения, обильные лохии, импотенция, поллюции.
- Болезни из-за восприятия патогенного холода: кашель, одышка, боль в эпигастральной области, дисменорея со свойствами холода типа недостатка, альгоменорея из-за скопления холода-сырости.
- Болезни сосуда Жэнь-май: грыжа, бели, менструальные нарушения, бесплодие, задержка мочи, ночное недержание мочи, поллюции, боли в нижней части живота и в области половых органов.

#### Сочетание:

- Все болезни тонкого кишечника: [V27 Сяо-чан-шу](#), Гуань-юань VC.4 (метод сочетания шу-точек спины и му-точек живота).
- Затрудненное мочеиспускание желтой мочой: Гуань-юань VC.4, [RP9 Инь-лин-цюань](#).
- Гонорея из-за нарушений Ци (недостаток Ци селезенки или застой Ци печени), частое мочеиспускание: Гуань-юань VC.4, [R1 Юн-цюань](#).
- Эпилепсия, головная боль: [TR16 Тянь-ю](#), [V60 Кунь-лунь](#), [V12 Фэн-мэн](#), Гуань-юань VC.4.
- Приступы жара в теле и головной боли: [VG11 Шэнь-дао](#), Гуань-юань VC.4.
- Понос: Гуань-юань VC.4, [R3 Тай-си](#).
- Желтый цвет мочи: [R3 Тай-си](#), Гуань-юань VC.4, [V30 Бай-хуань-шу](#).
- Болезни со свойствами недостатка: [VC6 Ци-хай](#), Гуань-юань VC.4, [V40 Вэй-чжун](#).
- Недержание мочи: [C7 Шэнь-мэн](#), [P10 Юй-цзи](#), [F3 Тай-чун](#), [F1 Да-дунь](#), Гуань-юань VC.4.
- Боль в нижней части живота: [E33 Инь-ши](#), [V57 Чэн-шань](#), [G18 Ся-лян](#), [R7 Фу-лю](#), [F4 Чжун-фэн](#), [F1 Да-дунь](#), [IG8 Сяо-хай](#), Гуань-юань VC.4, [V23 Шэнь-шу](#).
- Бели: [VB26 Дай-май](#), Гуань-юань VC.4, [VC6 Ци-хай](#), [RP6 Сань-инь-цзяо](#), [V30 Бай-хуань-шу](#), [MC5 Цзянь-ши](#).
- Обильные лохии: [VC6 Ци-хай](#), Гуань-юань VC.4.
- Поллюции: [V23 Шэнь-шу](#), Гуань-юань VC.4, [RP6 Сань-инь-цзяо](#).
- Проникновение патогенной Ци в каналы и коллатерали: [VC6 Ци-хай](#), Гуань-юань VC.4, [VC12 Чжун-вань](#).
- Вздутие живота: [VC13 Шан-вань](#), [E36 Цзу-сань-ли](#), [F13 Чжан-мэн](#), [R10 Инь-гу](#), Гуань-юань VC.4, [F14 Ци-мэн](#), [F2 Син-цзянь](#), [V20 Пи-шу](#), [VB39 Сюань-чжун](#), [E20 Чан-мань](#).
- Красно-желтый цвет мочи: [R10 Инь-гу](#), [R3 Тай-си](#), [V23 Шэнь-шу](#), [VC6 Ци-хай](#), [V28 Пан-гуан-шу](#), Гуань-юань VC.4.
- Грыжа, боль в нижней части живота: [R6 Чжао-хай](#), [VC7 Инь-цзяо](#), [F8 Цюй-цюань](#), [VC6 Ци-хай](#), Гуань-юань VC.4.
- Грыжа: Гуань-юань VC.4, [F1 Да-дунь](#).
- Длительная боль в области сердца, вызванная нарушениями в почках и поднятием патогенной Ци к сердцу: Гуань-юань VC.4, [VB26 Дай-май](#).
- Маточные кровотечения: Гуань-юань VC.4, [VC6 Ци-хай](#).
- Задержка мочи, недержание мочи, поллюции, импотенция, менструальные нарушения: Гуань-юань VC.4, [V23 Шэнь-шу](#), [RP6 Сань-инь-цзяо](#), [E36 Цзу-сань-ли](#).
- Понос, боль в животе: Гуань-юань VC.4, [V27 Сяо-чан-шу](#), [E25 Тянь-шу](#), [E36 Цзу-сань-ли](#).

**Техника:** перпендикулярное укалывание на глубину 1 — 2 цуня. Остерегаться использовать точку при беременности. Перед иглоукалыванием следует попросить пациента помочиться. Прижигание: 3 — 10 конусов.

**Автор:** П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии"




Категория: [Передний срединный меридиан \(VC\)](#) | Добавил: [admin](#) (17.07.2009) Просмотров: **16923**  
Всего комментариев: **0**

Имя \*:

Email:

Код \*:



Смотрите также

Простатит -  
Заболевания  
мочеполовой...

Заболевания  
мочеполовой  
системы

Меридиан легких (

Relap